

# INVENTARIO TEMATICO



## LEGENDA

Hd: altezza dominante

S: statura

IT: raggruppa i dati derivanti dall'inventario tematico

V: volume ad ettaro stimato

G: area basimetrica ad ettaro stimata

Vpi: volume ad ettaro stimato dei soggetti preinventariali

Gpi: area basimetrica ad ettaro stimata dei soggetti preinventariali

ID: raggruppa i dati derivanti dall'inventario dendrometrico

V: volume ad ettaro di strato derivante da rilievo relascopico

G: area basimetrica ad ettaro di strato derivante da rilievo relascopico

ES: errore standard di stima del volume ad ettaro

Ic: incremento corrente annuo

Nha: numero di piante ad ettaro

Vpi: volume ad ettaro di strato dei soggetti preinventariali

Gpi: area basimetrica ad ettaro di strato dei soggetti preinventariali

---

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/1**

5,85 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 40 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 320 m3/ha, G 45 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (3): V 279 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 15 m3/ha, IC 5,94 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                         | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Abies alba (abete bianco)             | 70,0% |       | 137/2011/1      | 5,85 |
| Picea abies (abete rosso)             | 20,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)              | 5,0%  |       |                 |      |
| Laburnum anagyroides (maggiociondolo) | 3,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano)   | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/2**

3,98 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura grossolana, S 30 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 250 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (3): V 279 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 15 m3/ha, IC 5,94 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                         | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Abies alba (abete bianco)             | 55,0% |       | 137/2011/2      | 3,98 |
| Fagus sylvatica (faggio)              | 20,0% |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)             | 15,0% |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano)   | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)           | 3,0%  |       |                 |      |
| Laburnum anagyroides (maggiociondolo) | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/3**

3,37 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura fine, S 19 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (2): V 184 m3/ha, G 24 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 4,09 m3/ha/anno, N/ha 360, Vpi 28 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 28,0% |       | 137/2011/3      | 3,37 |
| Larix decidua (larice)             | 20,0% |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 20,0% |       |                 |      |
| Abies alba (abete bianco)          | 18,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 8,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 3,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 2,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/4**

5,01 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura fine, S 19 m, copertura 70%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 80 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Larix decidua (larice)             | 30,0% |       | 137/2011/20     | 5,01 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 28,0% |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 20,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 8,0%  |       |                 |      |
| Abies alba (abete bianco)          | 8,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 3,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 2,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/5**

0,88 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura grossolana, S 19 m, copertura 70%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 70 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 0,89 m3/ha/anno, N/ha 138, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                     | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre) | 55,0% |       | 137/2011/3      | 0,49 |
| Fagus sylvatica (faggio)          | 30,0% |       | 137/2011/4      | 0,39 |
| Picea abies (abete rosso)         | 10,0% |       |                 |      |
| Abies alba (abete bianco)         | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/6**

3,33 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 26 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 130 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (2): V 184 m3/ha, G 24 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 4,09 m3/ha/anno, N/ha 360, Vpi 28 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                         | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Abies alba (abete bianco)             | 40,0% |       | 137/2011/5      | 3,33 |
| Fagus sylvatica (faggio)              | 35,0% |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)             | 15,0% |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano)   | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)           | 3,0%  |       |                 |      |
| Laburnum anagyroides (maggiociondolo) | 2,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/7**

0,76 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abietetò calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura grossolana, S 13 m, copertura 60%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione assente.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 30 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (2): V 184 m3/ha, G 24 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 4,09 m3/ha/anno, N/ha 360, Vpi 28 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 38,0% |       | 137/2011/6      | 0,76 |
| Abies alba (abete bianco)          | 27,0% |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 15,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/8**

3,25 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abietetò calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 32 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (3): V 279 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 15 m3/ha, IC 5,94 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Abies alba (abete bianco)           | 60,0% |       | 137/2011/8      | 3,25 |
| Fagus sylvatica (faggio)            | 20,0% |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)           | 15,0% |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/9**

1,70 ha, formazioni erbacee, condizionamenti da insediamenti ricreativi, pascoli e praterie pingui.

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/9      | 0,06 |
| 137/2011/18     | 1,64 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/10**

0,34 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, multiplano a distribuzione aggregata, tessitura grossolana, S 8 m, copertura 40%, fertilità infima (T9), rinnovazione discreta.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Picea abies (abete rosso)          | 40,0% |       | 137/2011/10     | 0,34 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 20,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 15,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)             | 10,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/11**

0,53 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura grossolana, S 12 m, copertura 40%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 40 m3/ha, G 7 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 8 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 0,89 m3/ha/anno, N/ha 138, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 30,0% |       | 137/2011/11     | 0,53 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 30,0% |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 20,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 10,0% |       |                 |      |
| Abies alba (abete bianco)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 3,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/12**

0,30 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abietetò calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 60%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 100 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (2): V 184 m3/ha, G 24 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 4,09 m3/ha/anno, N/ha 360, Vpi 28 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                         | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Abies alba (abete bianco)             | 60,0% |       | 137/2011/12     | 0,30 |
| Fagus sylvatica (faggio)              | 30,0% |       |                 |      |
| Laburnum anagyroides (maggiociondolo) | 5,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)             | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/13**

10,01 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abietetò calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 32 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 250 m3/ha, G 35 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (3): V 279 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 15 m3/ha, IC 5,94 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area  |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-------|
| Abies alba (abete bianco)           | 55,0% |       | 137/2011/13     | 10,01 |
| Fagus sylvatica (faggio)            | 30,0% |       |                 |       |
| Picea abies (abete rosso)           | 10,0% |       |                 |       |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 4,0%  |       |                 |       |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 1,0%  |       |                 |       |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/14**

3,81 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura fine, S 19 m, copertura 60%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 60 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

| COMPOSIZIONE:             | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Abies alba (abete bianco) | 50,0% |       | 137/2011/14     | 3,81 |
| Fagus sylvatica (faggio)  | 20,0% |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso) | 20,0% |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)    | 10,0% |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/15**

1,73 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 22 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 200 m3/ha, G 35 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (3): V 279 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 15 m3/ha, IC 5,94 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 60,0% |       | 137/2011/15     | 1,73 |
| Abies alba (abete bianco)           | 33,0% |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/16**

3,29 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto calcicolo con faggio stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 36 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 35 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (3): V 279 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 15 m3/ha, IC 5,94 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:             | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Abies alba (abete bianco) | 80,0% |       | 137/2011/16     | 3,29 |
| Picea abies (abete rosso) | 18,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)  | 2,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/17**

4,55 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 11 m, copertura 95%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 1200 allievi/matricine. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 25 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 85,0% |       | 137/2011/17     | 0,93 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       | 137/2011/21     | 3,24 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       | 137/2011/22     | 0,24 |
| Abies alba (abete bianco)          | 2,0%  |       | 137/2011/23     | 0,13 |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/18**

0,70 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 23 m, copertura 100%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 40 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (2): V 184 m3/ha, G 24 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 4,09 m3/ha/anno, N/ha 360, Vpi 28 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:             | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Picea abies (abete rosso) | 95,0% |       | 137/2011/19     | 0,70 |
| Abies alba (abete bianco) | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/19**

1,23 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 85%,ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali assenti.

IT: V 5 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 13 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 60,0% |       | 137/2011/24     | 0,60 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 20,0% |       | 137/2011/25     | 0,62 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |



**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/20**

8,19 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 18 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 80 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (6): V 58 m3/ha, G 9 m2/ha, ES 11 m3/ha, IC 1,51 m3/ha/anno, N/ha 189, Vpi 56 m3/ha, Gpi 11 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 70,0% |       | 137/2011/26     | 0,27 |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 5,0%  |       | 137/2011/27     | 0,12 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 5,0%  |       | 137/2011/56     | 7,80 |
| Quercus pubescens (roverella)       | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 4,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)    | 3,0%  |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)    | 2,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/21**

2,89 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 14 m, copertura 90%, ceduo da convertire, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 40 m3/ha, G 8 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 12 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 65,0% |       | 137/2011/28     | 2,89 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/22**

0,96 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto su faggeta con carpino nero, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 80%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 41 a 45 anni, 1200 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 45,0% |       | 137/2011/29     | 0,96 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 10,0% |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 10,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/23**

7,22 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto su faggeta con carpino nero, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 80%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 41 a 45 anni, 1200 allievi/matricine. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 45,0% |       | 137/2011/63     | 1,50 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       | 137/2011/77     | 5,71 |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 10,0% |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 10,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/24**

39,34 ha, improduttivo

| Unità forestali | area  |
|-----------------|-------|
| 137/2011/30     | 37,78 |
| 137/2011/31     | 0,69  |
| 137/2011/33     | 0,31  |
| 137/2011/45     | 0,23  |
| 137/2011/47     | 0,33  |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/25**

3,25 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, perticaia, Hd 12 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 21 a 40 anni; ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 41 a 45 anni, 600 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 40,0% |       | 137/2011/32     | 1,04 |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 20,0% |       | 137/2011/72     | 2,21 |
| Betula pendula (betulla)           | 20,0% |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 9,0%  |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)             | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/26**

0,99 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con orniello su pineta con faggio o specie nobili, monoplano a distribuzione lacunosa, perticaia, Hd 15 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 5 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 60,0% |       | 137/2011/34     | 0,99 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 20,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/27**

0,55 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico su ostrio-querceto, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 8 m, copertura 40%, ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 600 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 5 m3/ha, Gpi 3 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 50,0% |       | 137/2011/35     | 0,55 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 40,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 3,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/28**

5,00 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico su pineta con faggio o specie nobili, monoplano a distribuzione regolare, Hd 8 m, copertura 80%, ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 1200 allievi/matricine. Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 3 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 12 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 40,0% |       | 137/2011/36     | 1,39 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 23,0% |       | 137/2011/49     | 2,72 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 10,0% |       | 137/2011/59     | 0,22 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       | 137/2011/60     | 0,68 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/29**

10,31 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 8 m, copertura 85%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 1200 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 2 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 23 m3/ha, Gpi 12 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 45,0% |       | 137/2011/37     | 0,30 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 30,0% |       | 137/2011/42     | 0,18 |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 10,0% |       | 137/2011/48     | 9,83 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/30**

21,17 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 8 m, copertura 85%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 2 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 18 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area  |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|-------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 45,0% |       | 137/2011/38     | 13,09 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 30,0% |       | 137/2011/39     | 1,95  |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 10,0% |       | 137/2011/40     | 0,79  |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       | 137/2011/41     | 5,34  |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |       |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |       |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |       |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |       |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |       |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/31**

1,79 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 90%, ceduo da convertire, fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 600 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 80,0% |       | 137/2011/43     | 1,79 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 8,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 3,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)             | 1,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/32**

1,73 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili su faggeta mesalpica con conifere, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 16 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni;

ceduo in conversione, fertile, classe di età da 16 a 20 anni, 700 allievi/matricine. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 130 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (1): V 79 m3/ha, G 12 m2/ha, ES 19 m3/ha, Vpi 98 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 47,0% |       | 137/2011/44     | 1,73 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 20,0% |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)              | 10,0% |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)    | 5,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 3,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 3,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 2,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/33**

0,95 ha, improduttivo

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/46     | 0,08 |
| 137/2011/58     | 0,06 |
| 137/2011/113    | 0,45 |
| 137/2011/114    | 0,08 |
| 137/2011/115    | 0,08 |
| 137/2011/126    | 0,12 |
| 137/2011/178    | 0,09 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/34**

2,27 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 12 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 900 allievi/matricine. Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 40 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 42,0% |       | 137/2011/50     | 2,27 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 15,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 3,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/35**

0,65 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 80%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 26 a 30 anni, 1200 allievi/matricine. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 40,0% |       | 137/2011/51     | 0,65 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 20,0% |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 20,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/36**

1,18 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero su faggeta con tasso o agrifoglio, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 90%, ceduo da convertire, mediamente fertile, classe di età da 41 a 45 anni, 900 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 52,0% |       | 137/2011/52     | 1,18 |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 10,0% |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)             | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)       | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 5,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)               | 2,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 1,0%  |       |                 |      |
|                                     |       |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/37**

22,42 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta con tasso o agrifoglio stabile, biplano a distribuzione regolare, adulto su novelleto, Hd 20 m, copertura 95% su 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione buona, classe di età da 101 a 130 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 170 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (5): V 119 m3/ha, G 17 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 3,57 m3/ha/anno, N/ha 315, Vpi 45 m3/ha, Gpi 9 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area  |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 60,0% | 0,0%  | 137/2011/53     | 16,39 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 15,0% | 0,0%  | 137/2011/232    | 6,04  |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)    | 6,0%  | 0,0%  |                 |       |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 5,0%  | 0,0%  |                 |       |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 5,0%  | 0,0%  |                 |       |
| Larix decidua (larice)              | 5,0%  | 0,0%  |                 |       |
| Prunus padus (ciliegio)             | 4,0%  | 0,0%  |                 |       |
| Taxus baccata (tasso)               | 0,0%  | 70,0% |                 |       |
| Abies alba (abete bianco)           | 0,0%  | 20,0% |                 |       |
| Picea abies (abete rosso)           | 0,0%  | 10,0% |                 |       |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/38**

0,90 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con tasso o agrifoglio stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 21 m, copertura 95%, ceduo da convertire, fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 700 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 60,0% |       | 137/2011/54     | 0,38 |
| Taxus baccata (tasso)               | 10,0% |       | 137/2011/233    | 0,52 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 5,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 5,0%  |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)    | 5,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/39**

6,37 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta con tasso o agrifoglio stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 20 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione buona, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 160 m3/ha, G 25 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (5): V 119 m3/ha, G 17 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 3,57 m3/ha/anno, N/ha 315, Vpi 45 m3/ha, Gpi 9 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 53,0% |       | 137/2011/55     | 6,37 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 8,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 5,0%  |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)    | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)       | 5,0%  |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)              | 5,0%  |       |                 |      |
| Abies alba (abete bianco)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)             | 3,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)               | 2,0%  |       |                 |      |
| Corylus avellana (nocciolo)         | 2,0%  |       |                 |      |
| Prunus padus (ciliegio)             | 1,0%  |       |                 |      |
| Acer campestre (acero campestre)    | 1,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)           | 1,0%  |       |                 |      |



**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/40**

2,01 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta con tasso o agrifoglio stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 24 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (5): V 119 m3/ha, G 17 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 3,57 m3/ha/anno, N/ha 315, Vpi 45 m3/ha, Gpi 9 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 85,0% |       | 137/2011/57     | 2,01 |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)           | 2,0%  |       |                 |      |
| Prunus padus (ciliegio)             | 1,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 1,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)       | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/41**

1,72 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 12 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 41 a 60 anni;

ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 41 a 45 anni, 700 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 30 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 35,0% |       | 137/2011/61     | 1,26 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 30,0% |       | 137/2011/71     | 0,46 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 3,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/42**

3,82 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su orno-ostrieto tipico, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 12 m, copertura 85%, ceduo fuori turno, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 600 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Betula pendula (betulla)           | 50,0% |       | 137/2011/62     | 1,93 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 30,0% |       | 137/2011/64     | 1,89 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)             | 5,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 5,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/43**

0,63 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 10 m, copertura 90%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 900 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 40,0% |       | 137/2011/65     | 0,63 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 30,0% |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 10,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/44**

2,71 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili su faggeta con tasso o agrifoglio, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 15 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni;

ceduo da convertire, fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 100 m3/ha, G 12 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 13 m2/ha

ID (1): V 79 m3/ha, G 12 m2/ha, ES 19 m3/ha, Vpi 98 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 40,0% |       | 137/2011/66     | 2,71 |
| Fagus sylvatica (faggio)            | 30,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 11,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 10,0% |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)               | 2,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)    | 2,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 2,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 2,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)            | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/45**

3,62 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 7 m, copertura 75%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 16 a 20 anni, 600 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali assenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 5 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 85,0% |       | 137/2011/68     | 0,53 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 8,0%  |       | 137/2011/69     | 0,67 |
| Betula pendula (betulla)           | 2,0%  |       | 137/2011/82     | 2,43 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 2,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/46**

1,36 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto primitivo su orno-ostrieto tipico, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 5 m, copertura 60%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 11 a 15 anni, 600 allievi/matricine. Superficie scarsamente servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali assenti.  
IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 2 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 85,0% |       | 137/2011/67     | 1,36 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 8,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 2,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/47**

6,75 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con orniello su pineta con faggio o specie nobili, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 14 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 21 a 40 anni;  
ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 600 allievi/matricine. Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.  
IT: V 5 m3/ha, G 3 m2/ha, Vpi 25 m3/ha, Gpi 10 m2/ha  
ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 30,0% |       | 137/2011/70     | 6,75 |
| Betula pendula (betulla)           | 20,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 20,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)             | 10,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/48**

2,02 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 90%,ceduo a regime, fertile, classe di età >46 anni, 800 allievi/matricine.  
Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.  
IT: V 10 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 30 m2/ha  
ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 50,0% |       | 137/2011/73     | 0,46 |
| Fagus sylvatica (faggio)            | 20,0% |       | 137/2011/89     | 1,57 |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)       | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 5,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 5,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/49**

3,25 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 14 m, copertura 90%,ceduo da convertire, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 40 m3/ha, G 8 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 12 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 66,0% |       | 137/2011/74     | 3,25 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 12,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/50**

1,75 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 11 m, copertura 95%,ceduo da convertire, fertile, classe di età >46 anni, 900 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 55,0% |       | 137/2011/75     | 1,75 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 20,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 15,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 5,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)    | 2,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 1,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)           | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/51**

1,27 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 85%,ceduo da convertire, fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 900 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 6 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                         | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)              | 70,0% |       | 137/2011/76     | 0,94 |
| Fraxinus ornus (orniello)             | 10,0% |       | 137/2011/292    | 0,33 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)    | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)              | 2,0%  |       |                 |      |
| Laburnum anagyroides (maggiociondolo) | 1,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)      | 1,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)     | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/52**

0,46 ha, improduttivo

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/78     | 0,46 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/53**

14,67 ha, improduttivo

| Unità forestali | area  |
|-----------------|-------|
| 137/2011/79     | 0,89  |
| 137/2011/90     | 13,53 |
| 137/2011/91     | 0,26  |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/54**

2,16 ha, improduttivo

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/80     | 0,99 |
| 137/2011/92     | 1,17 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/55**

0,98 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 6 m, copertura 60%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 69,0% |       | 137/2011/81     | 0,98 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/56**

1,51 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 5 m, copertura 60%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 11 a 15 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 35,0% |       | 137/2011/83     | 1,51 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 20,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |
|                                    |       |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/57**

12,60 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 6 m, copertura 75%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 25 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area  |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|-------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 50,0% |       | 137/2011/84     | 1,17  |
| Quercus pubescens (roverella)      | 25,0% |       | 137/2011/104    | 11,43 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |       |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |       |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |       |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 3,0%  |       |                 |       |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 1,0%  |       |                 |       |
| Betula pendula (betulla)           | 1,0%  |       |                 |       |
|                                    |       |       |                 |       |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/58**

2,41 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 8 m, copertura 70%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 1500 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 45,0% |       | 137/2011/85     | 1,80 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 35,0% |       | 137/2011/105    | 0,61 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/59**

2,25 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto su faggeta con carpino nero, monoplano a distribuzione regolare, Hd 8 m, copertura 80%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 1200 allievi/matricine. Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 35 m3/ha, Gpi 18 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 55,0% |       | 137/2011/86     | 2,25 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 10,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 6,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/60**

2,21 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 7 m, copertura 90%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 1200 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 70,0% |       | 137/2011/87     | 2,21 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 5,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/61**

6,58 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 8 m, copertura 90%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 1200 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 40,0% |       | 137/2011/88     | 6,58 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 10,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 3,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 2,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)             | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/62**

4,05 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico su pineta con orniello, monoplano a distribuzione regolare, Hd 8 m, copertura 90%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 41 a 45 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 44,0% |       | 137/2011/93     | 0,64 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 30,0% |       | 137/2011/144    | 3,41 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 4,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |



**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/63**

1,12 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico su pineta con orniello, monoplano a distribuzione regolare, Hd 8 m, copertura 90%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 41 a 45 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 25 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 44,0% |       | 137/2011/98     | 0,41 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 30,0% |       | 137/2011/99     | 0,16 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       | 137/2011/100    | 0,55 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 4,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/64**

1,59 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto primitivo stabile, monoplano a distribuzione aggregata, Hd 6 m, copertura 40%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 600 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 5 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 46,0% |       | 137/2011/94     | 0,55 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 40,0% |       | 137/2011/142    | 0,62 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       | 137/2011/143    | 0,42 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 4,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/65**

3,71 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico su ostrio-querceto, monoplano a distribuzione regolare, Hd 7 m, copertura 90%,ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 900 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 7 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fraxinus ornus (orniello)          | 40,0% |       | 137/2011/95     | 0,64 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 40,0% |       | 137/2011/96     | 1,87 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 10,0% |       | 137/2011/97     | 1,21 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 4,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/66**

4,57 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 7 m, copertura 90%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 60,0% |       | 137/2011/101    | 4,21 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 30,0% |       | 137/2011/102    | 0,36 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/67**

1,47 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 11 m, copertura 95%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 1500 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 60,0% |       | 137/2011/103    | 0,66 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 30,0% |       | 137/2011/146    | 0,82 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 3,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/68**

7,24 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto su pineta con orniello, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 90%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 1200 allievi/matricine. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 25 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 35,0% |       | 137/2011/119    | 3,87 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 20,0% |       | 137/2011/291    | 3,36 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 8,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 2,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/69**

3,04 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto su faggeta con carpino nero, monoplano a distribuzione regolare, Hd 13 m, copertura 90%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 26 a 30 anni, 1500 allievi/matricine. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 2 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 30,0% |       | 137/2011/106    | 3,04 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 20,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 10,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/70**

0,45 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 12 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 21 a 40 anni. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 0,89 m3/ha/anno, N/ha 138, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 70,0% |       | 137/2011/107    | 0,45 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/71**

4,60 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 90%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 21 a 25 anni, 1500 allievi/matricine. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 35 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 45,0% |       | 137/2011/108    | 4,60 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 15,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 2,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |
|                                    |       |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/72**

1,34 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta con tasso o agrifoglio stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, perticaia, Hd 17 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 70 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (6): V 58 m3/ha, G 9 m2/ha, ES 11 m3/ha, IC 1,51 m3/ha/anno, N/ha 189, Vpi 56 m3/ha, Gpi 11 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 70,0% |       | 137/2011/109    | 1,34 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 13,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Abies alba (abete bianco)          | 2,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 1,0%  |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)   | 1,0%  |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)             | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/73**

7,34 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili su faggeta con tasso o agrifoglio, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 21 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni;

ceduo da convertire, fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 800 allievi/matricine. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 110 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (1): V 79 m3/ha, G 12 m2/ha, ES 19 m3/ha, Vpi 98 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 40,0% |       | 137/2011/110    | 7,34 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 40,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 3,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 2,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/74**

1,95 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili su faggeta con carpino nero, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 13 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni;  
ceduo da convertire, mediamente fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 80 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (1): V 79 m3/ha, G 12 m2/ha, ES 19 m3/ha, Vpi 98 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 45,0% |       | 137/2011/111    | 1,95 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 14,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 14,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 14,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/75**

1,47 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 17 m, copertura 85%, ceduo da convertire, fertile, classe di età da 41 a 45 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 65,0% |       | 137/2011/112    | 1,47 |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 15,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 6,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)       | 5,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 2,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)    | 1,0%  |       |                 |      |
| Abies alba (abete bianco)           | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/76**

1,15 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 11 m, copertura 90%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 1000 allievi/matricine. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 50,0% |       | 137/2011/116    | 1,15 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 4,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/77**

0,92 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 12 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 21 a 40 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 0,89 m3/ha/anno, N/ha 138, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 52,0% |       | 137/2011/117    | 0,92 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 20,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 7,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 4,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/78**

4,64 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili su faggeta con carpino nero, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 15 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni;

ceduo da convertire, mediamente fertile, classe di età da 21 a 25 anni, 600 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 70 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

ID (1): V 79 m3/ha, G 12 m2/ha, ES 19 m3/ha, Vpi 98 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 30,0% |       | 137/2011/118    | 4,64 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 30,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 18,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)       | 5,0%  |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 2,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)            | 2,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 2,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)           | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/79**

0,46 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 12 m, copertura 75%, ceduo in conversione, fertile, classe di età da 6 a 10 anni, 600 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 15 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 30,0% |       | 137/2011/120    | 0,46 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 20,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 16,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 3,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/80**

0,92 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 14 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni; ceduo da convertire, mediamente fertile, classe di età da 21 a 25 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 80 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (1): V 79 m3/ha, G 12 m2/ha, ES 19 m3/ha, Vpi 98 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 50,0% |       | 137/2011/122    | 0,92 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 25,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 3,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 1,0%  |       |                 |      |
| Abies alba (abete bianco)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/81**

0,87 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 14 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 21 a 25 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 50,0% |       | 137/2011/121    | 0,87 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 15,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 13,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 9,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 9,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 2,0%  |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)             | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |



**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/82**

1,44 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 11 m, copertura 80%, ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 16 a 20 anni, 1500 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 30 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 40,0% |       | 137/2011/123    | 1,44 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 30,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 24,0% |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/83**

1,52 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta con tasso o agrifoglio stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 20 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 90 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (6): V 58 m3/ha, G 9 m2/ha, ES 11 m3/ha, IC 1,51 m3/ha/anno, N/ha 189, Vpi 56 m3/ha, Gpi 11 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 70,0% |       | 137/2011/124    | 1,52 |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 15,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 3,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)    | 2,0%  |       |                 |      |
| Prunus padus (ciliegio)             | 1,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 1,0%  |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)    | 1,0%  |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)              | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)           | 1,0%  |       |                 |      |
|                                     |       |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/84**

0,35 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su faggeta con carpino nero, biplano a distribuzione lacunosa, perticaia su novelleto, Hd 12 m, copertura 40% su 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione buona, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 12 m2/ha, Vpi 5 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 0,89 m3/ha/anno, N/ha 138, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 60,0% | 0,0%  | 137/2011/125    | 0,35 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% | 40,0% |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% | 0,0%  |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  | 50,0% |                 |      |
| Corylus avellana (nocciolo)        | 0,0%  | 10,0% |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/85**

3,15 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 11 m, copertura 85%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 16 a 20 anni, 1500 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 44,0% |       | 137/2011/127    | 3,15 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 30,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/86**

0,81 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto su pineta con faggio o specie nobili, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 90%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 16 a 20 anni, 1000 allievi/matricine. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fraxinus ornus (orniello)          | 30,0% |       | 137/2011/128    | 0,81 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 30,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 20,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 15,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 4,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 1,0%  |       |                 |      |
|                                    |       |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/87**

2,52 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto su pineta con faggio o specie nobili, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 90%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 16 a 20 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 50,0% |       | 137/2011/129    | 2,52 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 12,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 8,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/88**

2,50 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto su faggeta con carpino nero, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 95%, ceduo da convertire, fertile, classe di età >46 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 15 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Quercus pubescens (roverella)      | 30,0% |       | 137/2011/130    | 2,50 |
| Castanea sativa (castagno)         | 20,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 20,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/89**

2,37 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto su faggeta con carpino nero, monoplano a distribuzione regolare, Hd 7 m, copertura 90%, ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 41 a 45 anni, 1200 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 8 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Quercus pubescens (roverella)      | 35,0% |       | 137/2011/131    | 2,37 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 15,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 7,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 3,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/90**

2,37 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 15 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni; ceduo da convertire, mediamente fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 500 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 30 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (1): V 79 m3/ha, G 12 m2/ha, ES 19 m3/ha, Vpi 98 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 30,0% |       | 137/2011/132    | 0,56 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 16,0% |       | 137/2011/171    | 1,82 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 16,0% |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 15,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 3,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/91**

0,71 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 7 m, copertura 80%, ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 1500 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% |       | 137/2011/133    | 0,71 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 20,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 20,0% |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 10,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 7,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 3,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/92**

1,10 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero su castagneto, monoplano a distribuzione regolare, Hd 11 m, copertura 90%,ceduo da convertire, fertile, classe di età da 26 a 30 anni, 900 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 30 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 25 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Castanea sativa (castagno)         | 40,0% |       | 137/2011/134    | 1,10 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 20,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 1,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |
|                                    |       |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/93**

2,40 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 90%,ceduo da convertire, fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 900 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 70 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 60,0% |       | 137/2011/135    | 2,40 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 4,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |
|                                    |       |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/94**

1,54 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 90%,ceduo da convertire, fertile, classe di età >46 anni, 900 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 18 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 50,0% |       | 137/2011/136    | 1,54 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 30,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/95**

1,48 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico su castagneto, monoplano a distribuzione regolare, Hd 13 m, copertura 95%,ceduo da convertire, fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 35 m3/ha, G 18 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 7 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 35,0% |       | 137/2011/137    | 0,15 |
| Castanea sativa (castagno)         | 30,0% |       | 137/2011/148    | 1,33 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 5,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 3,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/96**

4,08 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 15 m, copertura 90%,ceduo da convertire, fertile, classe di età da 41 a 45 anni, 700 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 45,0% |       | 137/2011/138    | 4,08 |
| Castanea sativa (castagno)         | 19,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 10,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Acer campestre (acero campestre)   | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/97**

1,52 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, monoplano, vuoto.

Superficie servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/139    | 0,19 |
| 137/2011/167    | 0,51 |
| 137/2011/168    | 0,26 |
| 137/2011/169    | 0,10 |
| 137/2011/170    | 0,18 |
| 137/2011/182    | 0,11 |
| 137/2011/187    | 0,17 |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/98**

1,08 ha, formazioni erbacee, condizionamenti da insediamenti ricreativi, pascoli magri e praterie macro-mesotermi dei suoli neutri o alcalini.

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/140    | 0,38 |
| 137/2011/159    | 0,70 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/99**

0,14 ha, improduttivo

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/141    | 0,10 |
| 137/2011/161    | 0,04 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/100**

1,24 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 6 m, copertura 85%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 2 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 50,0% |       | 137/2011/145    | 1,24 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 35,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 9,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/101**

0,92 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 90%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 1500 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 30 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fraxinus ornus (orniello)          | 40,0% |       | 137/2011/147    | 0,92 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 30,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 16,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 4,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 4,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/102**

1,26 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 16 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 130 m3/ha, G 25 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (8): V 151 m3/ha, G 23 m2/ha, ES 13 m3/ha, IC 3,64 m3/ha/anno, N/ha 353, Vpi 25 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 30,0% |       | 137/2011/149    | 1,26 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 25,0% |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 15,0% |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 13,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/103**

0,61 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 13 m, copertura 85%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 15 m3/ha, G 3 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 50,0% |       | 137/2011/150    | 0,61 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 15,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 8,0%  |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/104**

0,41 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta di pino nero su pineta con orniello, monoplano a distribuzione lacunosa, adulto, Hd 16 m, copertura 75%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 7 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 8 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 0,89 m3/ha/anno, N/ha 138, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero)            | 60,0% |       | 137/2011/151    | 0,41 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 20,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 3,0%  |       |                 |      |
| Salix alba (salice comune)         | 1,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 1,0%  |       |                 |      |



**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/105**

1,23 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura fine, S 20 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (8): V 151 m3/ha, G 23 m2/ha, ES 13 m3/ha, IC 3,64 m3/ha/anno, N/ha 353, Vpi 25 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 43,0% |       | 137/2011/152    | 1,23 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 15,0% |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 15,0% |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 5,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/106**

0,75 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, biplano a distribuzione regolare, adulto su novelletto, Hd 16 m, copertura 90% su 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 80 m3/ha, G 25 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (8): V 151 m3/ha, G 23 m2/ha, ES 13 m3/ha, IC 3,64 m3/ha/anno, N/ha 353, Vpi 25 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 48,0% | 0,0%  | 137/2011/153    | 0,75 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 15,0% | 0,0%  |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 15,0% | 0,0%  |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% | 0,0%  |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% | 1,0%  |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  | 1,0%  |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)   | 1,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Corylus avellana (nocciolo)        | 0,0%  | 98,0% |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/107**

1,41 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 9 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 26 a 30 anni, 600 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 45 m3/ha, G 8 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 65,0% |       | 137/2011/154    | 1,41 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 20,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 8,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 1,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/108**

2,95 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, castagneto stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura grossolana, S 22 m, copertura 75%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione buona.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 60 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (4): V 25 m3/ha, G 17 m2/ha, ES 0 m3/ha, N/ha 163, Vpi 15 m3/ha, Gpi 3 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Castanea sativa (castagno)         | 38,0% |       | 137/2011/155    | 2,95 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 27,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 12,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 5,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 3,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 3,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 3,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 2,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/109**

1,43 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 21 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 200 m3/ha, G 35 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (8): V 151 m3/ha, G 23 m2/ha, ES 13 m3/ha, IC 3,64 m3/ha/anno, N/ha 353, Vpi 25 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 35,0% |       | 137/2011/156    | 1,43 |
| Pinus nigra (pino nero)            | 20,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 10,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |
| Corylus avellana (nocciolo)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 4,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/110**

0,87 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, castagneto stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, maturo, Hd 20 m, copertura 60%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R3, preinventariali assenti.

IT: V 40 m3/ha, G 10 m2/ha

ID (4): V 25 m3/ha, G 17 m2/ha, ES 0 m3/ha, N/ha 163, Vpi 15 m3/ha, Gpi 3 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Castanea sativa (castagno)         | 80,0% |       | 137/2011/157    | 0,87 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 6,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 3,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 2,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 2,0%  |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)             | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/111**

2,93 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 20 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 130 m3/ha, G 35 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (5): V 119 m3/ha, G 17 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 3,57 m3/ha/anno, N/ha 315, Vpi 45 m3/ha, Gpi 9 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 54,0% |       | 137/2011/158    | 2,93 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 20,0% |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 10,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)   | 1,0%  |       |                 |      |
|                                    |       |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/112**

0,26 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, robinieto stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, adulto, Hd 21 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 60 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 80,0% |       | 137/2011/160    | 0,26 |
| Ailanthus altissima (ailanto)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 3,0%  |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)   | 2,0%  |       |                 |      |
|                                    |       |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/113**

3,18 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 21 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (8): V 151 m3/ha, G 23 m2/ha, ES 13 m3/ha, IC 3,64 m3/ha/anno, N/ha 353, Vpi 25 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 55,0% |       | 137/2011/162    | 3,18 |
| Castanea sativa (castagno)         | 20,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 9,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Prunus padus (ciliegio)            | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 2,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 1,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/114**

1,72 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, castagneto stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, adulto, Hd 18 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 60 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (4): V 25 m3/ha, G 17 m2/ha, ES 0 m3/ha, N/ha 163, Vpi 15 m3/ha, Gpi 3 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Castanea sativa (castagno)         | 84,0% |       | 137/2011/163    | 1,72 |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Prunus padus (ciliegio)            | 2,0%  |       |                 |      |
| Acer campestre (acero campestre)   | 1,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 1,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/115**

2,83 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, biplano a distribuzione regolare, adulto su novelleto, Hd 18 m, copertura 95% su 40%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 35 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (8): V 151 m3/ha, G 23 m2/ha, ES 13 m3/ha, IC 3,64 m3/ha/anno, N/ha 353, Vpi 25 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 70,0% | 0,0%  | 137/2011/164    | 2,83 |
| Castanea sativa (castagno)         | 16,0% | 5,0%  |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 3,0%  | 20,0% |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 3,0%  | 5,0%  |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 2,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 1,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Corylus avellana (nocciolo)        | 0,0%  | 65,0% |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 0,0%  | 5,0%  |                 |      |
|                                    |       |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/116**

2,59 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 21 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 140 m3/ha, G 25 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (8): V 151 m3/ha, G 23 m2/ha, ES 13 m3/ha, IC 3,64 m3/ha/anno, N/ha 353, Vpi 25 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 50,0% |       | 137/2011/165    | 2,59 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 20,0% |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 19,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 2,0%  |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)             | 1,0%  |       |                 |      |
|                                    |       |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/117**

2,37 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie nobili stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 17 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 130 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (8): V 151 m3/ha, G 23 m2/ha, ES 13 m3/ha, IC 3,64 m3/ha/anno, N/ha 353, Vpi 25 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 42,0% |       | 137/2011/166    | 2,37 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 17,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 5,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 3,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 2,0%  |       |                 |      |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 2,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/118**

1,11 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto su faggeta con carpino nero, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 90%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 700 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 18 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 35,0% |       | 137/2011/172    | 1,11 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 24,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 13,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 2,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/119**

1,17 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta di pino nero su ostriro-  
querceto, biplano a distribuzione lacunosa, adulto su spessina, Hd 17 m, copertura  
65% su 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100  
anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2,  
preinventariali presenti.

IT: V 160 m3/ha, G 25 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (9): V 115 m3/ha, G 15 m2/ha, ES 21 m3/ha, IC 2,45 m3/ha/anno, N/ha 266, Vpi  
54 m3/ha, Gpi 11 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero)            | 88,0% | 0,0%  | 137/2011/173    | 1,17 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 3,0%  | 30,0% |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 2,0%  | 10,0% |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 1,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 1,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Corylus avellana (nocciolo)        | 0,0%  | 60,0% |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/120**

4,60 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con faggio o specie  
nobili stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, adulto, Hd 18 m, copertura 80%,  
fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni;  
ceduo da convertire, mediamente fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 800  
allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali  
presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (1): V 79 m3/ha, G 12 m2/ha, ES 19 m3/ha, Vpi 98 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fraxinus ornus (orniello)          | 39,0% |       | 137/2011/174    | 4,60 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 15,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 15,0% |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 9,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 8,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 2,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/121**

1,12 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta di pino nero su pineta con  
orniello, monoplano a distribuzione lacunosa, perticaia, Hd 15 m, copertura 70%,  
fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta, classe di età da 21 a 40 anni.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R1,  
preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 7 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 50,0% |       | 137/2011/175    | 0,49 |
| Pinus nigra (pino nero)            | 30,0% |       | 137/2011/205    | 0,63 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 14,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/122**

0,64 ha, altri usi non forestali

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/176    | 0,64 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/123**

0,30 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su orno-ostrieto tipico, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 4 m, copertura 40%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 6 a 10 anni, 600 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 1 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 50,0% |       | 137/2011/177    | 0,30 |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 40,0% |       |                 |      |
| Ailanthus altissima (ailanto)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/124**

0,19 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico su faggeta con carpino nero, monoplano a distribuzione regolare, Hd 18 m, copertura 80%,ceduo in conversione, fertile, classe di età da 21 a 25 anni, 400 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 40 m3/ha, G 12 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 8 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 80,0% |       | 137/2011/179    | 0,19 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 4,0%  |       |                 |      |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/125**

3,20 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta di pino nero stabile, biplano a distribuzione regolare, adulto su spessina, Hd 24 m, copertura 90% su 75%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 25 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (9): V 115 m3/ha, G 15 m2/ha, ES 21 m3/ha, IC 2,45 m3/ha/anno, N/ha 266, Vpi 54 m3/ha, Gpi 11 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero)            | 99,0% | 0,0%  | 137/2011/180    | 3,20 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 1,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Ailanthus altissima (ailanto)      | 0,0%  | 1,0%  |                 |      |
| Corylus avellana (nocciolo)        | 0,0%  | 16,0% |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 0,0%  | 10,0% |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 0,0%  | 70,0% |                 |      |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 0,0%  | 3,0%  |                 |      |



**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/126**

0,38 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 18 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 11 a 15 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 40 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (1): V 79 m3/ha, G 12 m2/ha, ES 19 m3/ha, Vpi 98 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 30,0% |       | 137/2011/181    | 0,38 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 26,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 12,0% |       |                 |      |
| Ailanthus altissima (ailanto)      | 10,0% |       |                 |      |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 10,0% |       |                 |      |
| Corylus avellana (nocciolo)        | 7,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 3,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/127**

0,20 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 5 m, copertura 60%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 6 a 10 anni, 700 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 94,0% |       | 137/2011/183    | 0,20 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Betula pendula (betulla)           | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/128**

4,16 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su robinieto, monoplano a distribuzione lacunosa, novelletto, Hd 5 m, copertura 30%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione buona, classe di età da 1 a 20 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali assenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 2 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                 | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Robinia pseudacacia (robinia) | 55,0% |       | 137/2011/184    | 4,16 |
| Ailanthus altissima (ailanto) | 25,0% |       |                 |      |
| Populus alba (pioppo bianco)  | 15,0% |       |                 |      |
| Salix alba (salice comune)    | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/129**

0,25 ha, improduttivo

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/185    | 0,25 |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/130**

0,92 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, adulto, Hd 18 m, copertura 70%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 15 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 0,89 m3/ha/anno, N/ha 138, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 30,0% |       | 137/2011/186    | 0,92 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 30,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Populus alba (pioppo bianco)       | 3,0%  |       |                 |      |
| Salix alba (salice comune)         | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/131**

9,22 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 85%, ceduo a regime, fertile, classe di età da 31 a 35 anni, 1200 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 2 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 33 m3/ha, Gpi 19 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 70,0% |       | 137/2011/188    | 0,97 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 7,0%  |       | 137/2011/202    | 8,25 |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 5,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 2,0%  |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)   | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/132**

0,44 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 85%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 2 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 23 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 70,0% |       | 137/2011/203    | 0,44 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 7,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 2,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/133**

1,85 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con tasso o agrifoglio stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 90%,ceduo da convertire, fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 50,0% |       | 137/2011/189    | 1,85 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 29,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)   | 5,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/134**

0,48 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta con tasso o agrifoglio stabile, biplano a distribuzione regolare, adulto su novelleto, Hd 20 m, copertura 95% su 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione buona, classe di età da 101 a 130 anni. Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 170 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (5): V 119 m3/ha, G 17 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 3,57 m3/ha/anno, N/ha 315, Vpi 45 m3/ha, Gpi 9 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 60,0% | 0,0%  | 137/2011/190    | 0,48 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 15,0% | 0,0%  |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)    | 6,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 5,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 5,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Larix decidua (larice)              | 5,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Prunus padus (ciliegio)             | 4,0%  | 0,0%  |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)               | 0,0%  | 70,0% |                 |      |
| Abies alba (abete bianco)           | 0,0%  | 20,0% |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)           | 0,0%  | 10,0% |                 |      |
|                                     |       |       |                 |      |
|                                     |       |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/135**

0,69 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 12 m, copertura 70%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 500 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 5 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Quercus pubescens (roverella)      | 50,0% |       | 137/2011/191    | 0,69 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 30,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/136**

15,12 ha, improduttivo

| Unità forestali | area  |
|-----------------|-------|
| 137/2011/192    | 11,98 |
| 137/2011/194    | 3,15  |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/137**

7,08 ha, improduttivo

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/193    | 3,25 |
| 137/2011/195    | 3,83 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/138**

5,29 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 10 m, copertura 80%,ceduo fuori turno, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 2 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 28 m3/ha, Gpi 18 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 35,0% |       | 137/2011/196    | 1,72 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 30,0% |       | 137/2011/197    | 3,57 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 8,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 4,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 2,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/139**

2,52 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 12 m, copertura 80%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 60,0% |       | 137/2011/198    | 2,52 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 30,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 4,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/140**

0,56 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su ostrio-querceto, multipiano a distribuzione lacunosa, S 15 m, copertura 45%, ceduo fuori turno, fertile, classe di età da 16 a 20 anni, 700 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 8 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 50,0% |       | 137/2011/199    | 0,56 |
| Ailanthus altissima (ailanto)      | 20,0% |       |                 |      |
| Populus alba (pioppo bianco)       | 10,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/141**

2,35 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 75%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 700 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 3 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 85,0% |       | 137/2011/200    | 1,28 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 10,0% |       | 137/2011/201    | 1,07 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/142**

1,87 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta di pino nero su pineta con orniello, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 17 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione buona, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 85 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 0,89 m3/ha/anno, N/ha 138, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero)            | 60,0% |       | 137/2011/204    | 1,87 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 17,0% |       |                 |      |
| Ailanthus altissima (ailanto)      | 1,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 1,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/143**

0,36 ha, altri usi forestali

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/206    | 0,24 |
| 137/2011/207    | 0,12 |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/144**

0,18 ha, altri usi non forestali

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/208    | 0,18 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/145**

2,10 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 15 m, copertura 80%,ceduo in conversione, fertile, classe di età da 0 a 5 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 12 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 13 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 64,0% |       | 137/2011/209    | 2,10 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 20,0% |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 5,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 3,0%  |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)   | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/146**

0,88 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 8 m, copertura 95%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 26 a 30 anni, 1200 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 2 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 60,0% |       | 137/2011/210    | 0,88 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 15,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/147**

2,87 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 10 m, copertura 85%,ceduo da convertire, mediamente fertile, classe di età da 26 a 30 anni, 1200 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 52,0% |       | 137/2011/211    | 2,87 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 35,0% |       |                 |      |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 7,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 2,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/148**

1,07 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 90%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 21 a 25 anni, 1200 allievi/matricine. Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 3 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 32 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 69,0% |       | 137/2011/212    | 1,07 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 3,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 2,0%  |       |                 |      |
| Castanea sativa (castagno)         | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/149**

1,20 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta di pino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 19 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (9): V 115 m3/ha, G 15 m2/ha, ES 21 m3/ha, IC 2,45 m3/ha/anno, N/ha 266, Vpi 54 m3/ha, Gpi 11 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero)            | 70,0% |       | 137/2011/213    | 0,26 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       | 137/2011/214    | 0,94 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 9,0%  |       |                 |      |
| Ailanthus altissima (ailanto)      | 2,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 2,0%  |       |                 |      |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |
| altre conifere                     | 1,0%  |       |                 |      |
| Prunus padus (ciliegio)            | 1,0%  |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)             | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/150**

0,40 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta di pino nero su pineta con orniello, biplano a distribuzione regolare, adulto su ceduo, Hd 16 m, copertura 90% su 50%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni;

ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 11 a 15 anni, 1200 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 40 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 25 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero)            | 98,0% | 5,0%  | 137/2011/215    | 0,16 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  | 0,0%  | 137/2011/216    | 0,23 |
| Taxus baccata (tasso)              | 0,0%  | 1,0%  |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 0,0%  | 34,0% |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 0,0%  | 59,0% |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 0,0%  | 1,0%  |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/151**

0,93 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su robinieto, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 10 m, copertura 80%, ceduo fuori turno, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 67,0% |       | 137/2011/217    | 0,93 |
| Populus alba (pioppo bianco)       | 10,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |
| Prunus padus (ciliegio)            | 2,0%  |       |                 |      |
| altre conifere                     | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/152**

1,97 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, spessina, Hd 6 m, copertura 60%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione buona, classe di età da 1 a 20 anni.

Superficie mediamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 55,0% |       | 137/2011/290    | 1,97 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 20,0% |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 20,0% |       |                 |      |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/153**

0,97 ha, improduttivo

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/218    | 0,04 |
| 137/2011/219    | 0,92 |



**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/154**

0,85 ha, improduttivo

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/220    | 0,85 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/155**

70,01 ha, improduttivo

| Unità forestali | area  |
|-----------------|-------|
| 137/2011/221    | 0,13  |
| 137/2011/242    | 0,32  |
| 137/2011/249    | 0,75  |
| 137/2011/250    | 1,22  |
| 137/2011/251    | 1,83  |
| 137/2011/252    | 0,23  |
| 137/2011/263    | 62,61 |
| 137/2011/264    | 0,19  |
| 137/2011/265    | 2,73  |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/156**

3,27 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 8 m, copertura 70%,ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 25 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 70,0% |       | 137/2011/222    | 1,75 |
| Pinus nigra (pino nero)            | 20,0% |       | 137/2011/223    | 0,15 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       | 137/2011/267    | 1,37 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 3,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 2,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/157**

4,66 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta di pino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 17 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 130 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (9): V 115 m3/ha, G 15 m2/ha, ES 21 m3/ha, IC 2,45 m3/ha/anno, N/ha 266, Vpi 54 m3/ha, Gpi 11 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero)            | 70,0% |       | 137/2011/224    | 4,66 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 13,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 4,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)              | 1,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)   | 1,0%  |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)          | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/158**

3,06 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta di pino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 12 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (7): V 40 m3/ha, G 6 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 0,89 m3/ha/anno, N/ha 138, Vpi 49 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero)            | 69,0% |       | 137/2011/225    | 0,17 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 17,0% |       | 137/2011/226    | 2,16 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 8,0%  |       | 137/2011/227    | 0,74 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/159**

0,68 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta di pino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 12 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero)            | 80,0% |       | 137/2011/228    | 0,68 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 5,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 3,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 2,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/160**

1,83 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta di pino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 15 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R2, preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Pinus nigra (pino nero)            | 65,0% |       | 137/2011/229    | 1,83 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 20,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 10,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/161**

0,98 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con tasso o agrifoglio stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 13 m, copertura 90%, ceduo da convertire, fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 1200 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 30 m3/ha, G 12 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 30,0% |       | 137/2011/230    | 0,98 |
| Fagus sylvatica (faggio)            | 26,0% |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)               | 15,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 10,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)       | 5,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 2,0%  |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)    | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/162**

3,64 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 90%, ceduo da convertire, fertile, classe di età da 41 a 45 anni, 900 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 15 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                         | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)              | 72,0% |       | 137/2011/231    | 3,64 |
| Fraxinus ornus (orniello)             | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)    | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)         | 5,0%  |       |                 |      |
| Laburnum anagyroides (maggiociondolo) | 1,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)                 | 1,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)     | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/163**

1,12 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero su faggeta con tasso o agrifoglio, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 95%, ceduo da convertire, fertile, classe di età da 21 a 25 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 12 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                              | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|--------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)                   | 60,0% |       | 137/2011/234    | 1,12 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)         | 20,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)                  | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)              | 4,0%  |       |                 |      |
| Populus tremula (pioppo tremolo)           | 2,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano)        | 2,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori) | 1,0%  |       |                 |      |
| Taxus baccata (tasso)                      | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/164**

0,40 ha, improduttivo

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/235    | 0,40 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/165**

9,55 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta con tasso o agrifoglio stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 26 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione buona, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 130 m3/ha, G 35 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (5): V 119 m3/ha, G 17 m2/ha, ES 12 m3/ha, IC 3,57 m3/ha/anno, N/ha 315, Vpi 45 m3/ha, Gpi 9 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 57,0% |       | 137/2011/236    | 9,55 |
| Quercus pubescens (roverella)       | 10,0% |       |                 |      |
| Picea abies (abete rosso)           | 8,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 5,0%  |       |                 |      |
| Tilia cordata (tiglio selvatico)    | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 3,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 3,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 2,0%  |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)              | 2,0%  |       |                 |      |
| Prunus padus (ciliegio)             | 1,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)             | 1,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/166**

5,81 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 95%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 1200 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 35 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 40,0% |       | 137/2011/237    | 5,81 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 30,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/167**

1,24 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto su faggeta con carpino nero, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 8 m, copertura 65%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età >46 anni, 700 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 50,0% |       | 137/2011/238    | 1,24 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 10,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/168**

1,27 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 90%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 1500 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 60,0% |       | 137/2011/239    | 1,27 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 15,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 4,0%  |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       |                 |      |
|                                    |       |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/169**

2,71 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 90%,ceduo da convertire, fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 30 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                         | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)              | 75,0% |       | 137/2011/240    | 2,71 |
| Fraxinus ornus (orniello)             | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)    | 5,0%  |       |                 |      |
| Laburnum anagyroides (maggiociondolo) | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)     | 2,0%  |       |                 |      |
| Larix decidua (larice)                | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/170**

5,08 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 15 m, copertura 90%,ceduo da convertire, fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 60 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 50,0% |       | 137/2011/241    | 5,08 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 18,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 15,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)       | 8,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 5,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/171**

0,85 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 11 m, copertura 90%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                       | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)            | 50,0% |       | 137/2011/243    | 0,34 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero)  | 18,0% |       | 137/2011/268    | 0,51 |
| Fraxinus ornus (orniello)           | 15,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)       | 8,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)         | 5,0%  |       |                 |      |
| Acer pseudoplatanus (acero montano) | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)   | 2,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/172**

5,34 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 8 m, copertura 70%,ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 60,0% |       | 137/2011/244    | 2,54 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 20,0% |       | 137/2011/279    | 1,60 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 15,0% |       | 137/2011/281    | 0,35 |
| Pinus nigra (pino nero)            | 5,0%  |       | 137/2011/283    | 0,19 |
|                                    |       |       | 137/2011/284    | 0,55 |
|                                    |       |       | 137/2011/285    | 0,10 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/173**

5,01 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 12 m, copertura 90%,ceduo fuori turno, fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 25 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 50,0% |       | 137/2011/245    | 0,65 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       | 137/2011/246    | 0,08 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 15,0% |       | 137/2011/247    | 0,44 |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 10,0% |       | 137/2011/254    | 3,72 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       | 137/2011/259    | 0,12 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/174**

2,96 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 16 m, copertura 85%,ceduo da convertire, fertile, classe di età >46 anni, 900 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 45 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

ID (10): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 16 m3/ha, Vpi 137 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 70,0% |       | 137/2011/248    | 2,96 |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 10,0% |       |                 |      |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 10,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 5,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/175**

10,65 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 10 m, copertura 85%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 1500 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

ID (12): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 12 m3/ha, Vpi 69 m3/ha, Gpi 16 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area  |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|-------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 50,0% |       | 137/2011/253    | 10,65 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% |       |                 |       |
| Quercus pubescens (roverella)      | 15,0% |       |                 |       |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |       |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 3,0%  |       |                 |       |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |       |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/176**

10,29 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, ostrio-querceto stabile, monoplano a distribuzione regolare, Hd 10 m, copertura 85%,ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 1500 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 20 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 50,0% |       | 137/2011/255    | 4,80 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 25,0% |       | 137/2011/287    | 0,30 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 15,0% |       | 137/2011/288    | 5,19 |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 5,0%  |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 3,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 2,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/177**

10,58 ha, altri usi non forestali

| Unità forestali | area |
|-----------------|------|
| 137/2011/256    | 4,01 |
| 137/2011/257    | 6,57 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/178**

0,17 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta con carpino nero stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 15 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 25 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (6): V 58 m3/ha, G 9 m2/ha, ES 11 m3/ha, IC 1,51 m3/ha/anno, N/ha 189, Vpi 56 m3/ha, Gpi 11 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Fagus sylvatica (faggio)           | 65,0% |       | 137/2011/258    | 0,17 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 20,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       |                 |      |
| Sorbus aria (sorbo montano)        | 5,0%  |       |                 |      |



**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/179**

1,93 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su ostrio-querceto, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 8 m, copertura 50%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 11 a 15 anni, 600 allievi/matricine. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 4 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                 | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Robinia pseudacacia (robinia) | 50,0% |       | 137/2011/260    | 1,76 |
| Salix alba (salice comune)    | 29,0% |       | 137/2011/261    | 0,17 |
| Ailanthus altissima (ailanto) | 20,0% |       |                 |      |
| altre latifoglie              | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/180**

0,27 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su robinieto, monoplano a distribuzione regolare, Hd 6 m, copertura 75%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età da 11 a 15 anni, 500 allievi/matricine. Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 1 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 4 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                 | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Robinia pseudacacia (robinia) | 40,0% |       | 137/2011/262    | 0,27 |
| altre latifoglie              | 20,0% |       |                 |      |
| Salix alba (salice comune)    | 20,0% |       |                 |      |
| Ailanthus altissima (ailanto) | 10,0% |       |                 |      |
| Populus alba (pioppo bianco)  | 10,0% |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/181**

1,60 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico su ostrio-querceto, monoplano a distribuzione regolare, Hd 9 m, copertura 80%, ceduo a regime, mediamente fertile, classe di età >46 anni, 1000 allievi/matricine. Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 15 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 40,0% |       | 137/2011/266    | 1,60 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 20,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 15,0% |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 15,0% |       |                 |      |
| Fagus sylvatica (faggio)           | 10,0% |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/182**

4,56 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto primitivo stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 5 m, copertura 60%,ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 400 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 5 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 85,0% |       | 137/2011/269    | 1,38 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 10,0% |       | 137/2011/270    | 0,57 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 3,0%  |       | 137/2011/271    | 0,30 |
| Pinus nigra (pino nero)            | 1,0%  |       | 137/2011/274    | 0,73 |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 1,0%  |       | 137/2011/276    | 0,49 |
|                                    |       |       | 137/2011/277    | 0,82 |
|                                    |       |       | 137/2011/278    | 0,26 |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/183**

2,15 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto primitivo stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 5 m, copertura 60%,ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 400 allievi/matricine.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 2 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 90,0% |       | 137/2011/272    | 0,82 |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       | 137/2011/273    | 0,80 |
| Quercus pubescens (roverella)      | 2,0%  |       | 137/2011/275    | 0,53 |
| Pinus nigra (pino nero)            | 2,0%  |       |                 |      |
| Pinus silvestris (pino silvestre)  | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/184**

0,70 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico su ostrio-querceto, monoplano a distribuzione regolare, Hd 8 m, copertura 90%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 36 a 40 anni, 800 allievi/matricine.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 5 m3/ha, G 3 m2/ha, Vpi 15 m3/ha, Gpi 7 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 55,0% |       | 137/2011/280    | 0,70 |
| Ailanthus altissima (ailanto)      | 15,0% |       |                 |      |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 15,0% |       |                 |      |
| Pinus nigra (pino nero)            | 10,0% |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 5,0%  |       |                 |      |

**SCHEDE DESCRITTIVE****piano: 137****Comune di Mezzolombardo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/185**

0,18 ha, bosco a governo misto, condizionamenti assenti, pineta di pino nero su pineta con orniello, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 9 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni; ceduo fuori turno, poco fertile, classe di età >46 anni, 500 allievi/matricine. Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R1, preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 5 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 55,0% |       | 137/2011/282    | 0,18 |
| Pinus nigra (pino nero)            | 40,0% |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 4,0%  |       |                 |      |
| Quercus pubescens (roverella)      | 1,0%  |       |                 |      |

**- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 137/2011/186**

0,65 ha, bosco a ceduo, condizionamenti assenti, orno-ostrieto tipico stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, Hd 8 m, copertura 70%,ceduo a regime, poco fertile, classe di età da 21 a 25 anni, 500 allievi/matricine.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 3 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 7 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

ID (11): V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, ES 17 m3/ha, Vpi 113 m3/ha, Gpi 25 m2/ha

| COMPOSIZIONE:                      | % sup | % inf | Unità forestali | area |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------|
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | 70,0% |       | 137/2011/286    | 0,65 |
| Robinia pseudacacia (robinia)      | 15,0% |       |                 |      |
| Ailanthus altissima (ailanto)      | 7,0%  |       |                 |      |
| Fraxinus ornus (orniello)          | 5,0%  |       |                 |      |
| Populus alba (pioppo bianco)       | 3,0%  |       |                 |      |